

## Ist geeignet für:

- Kinder ab 2 Jahren
- Jugendliche
- Erwachsene, einschliesslich Schwangere und Stillende
- Patienten mit atopischer Dermatitis (im Akutstadium nur nach Vorbehandlung des Ekzems)

## Sollte nicht angewendet werden bei:

- Dellwarzen im Augen- und Genitalbereich
- Dellwarzen auf Schleimhäuten
- Kinder unter 2 Jahren
- Patienten mit angeborener/erworbener Immunsuppression (z.B. HIV)

## Convient :

- *Aux enfants de plus de 2 ans*
- *Aux adolescents*
- *Aux adultes, y compris femmes enceintes et qui allaitent*
- *Aux patients atteints d'eczéma atopique (dans les phases aiguës, seulement après traitement de l'eczéma)*

## Ne doit pas être utilisé :

- *Pour les molluscum contagiosum sur le contour de l'œil ou des parties génitales*
- *Pour les molluscum contagiosum des muqueuses*
- *Chez les enfants de moins de 2 ans*
- *Chez les personnes présentant un déficit immunitaire inné ou acquis (p.ex. infection au VIH)*

## É ideale per:

- Bambini sopra i 2 anni
- Ragazzi
- Adulti, incluse donne incinta e che allattano
- Pazienti affetti da dermatite atopica (in fase acuta, soltanto dopo il trattamento dell'eczema)

## Non deve essere utilizzato:

- Per il mollusco contagioso attorno agli occhi e nella zona genitale
- Per il mollusco contagioso delle mucose
- Nei bambini di età inferiore a 2 anni
- Nelle persone con sistema immunitario indebolito da cause congenite o acquisite (p.es. infezione da HIV)

08.11



AllergyCare AG  
Zürichstrasse 2  
CH-8134 Adliswil

Telefon 043 377 88 66  
Telefax 043 377 88 68

Internet [www.allergycare.ch](http://www.allergycare.ch)  
E-Mail [info@allergycare.ch](mailto:info@allergycare.ch)

# INFECTODELL®

mit 5% Kaliumhydroxid  
avec 5% d'hydroxyde de potassium  
con 5% di idrossido di potassio

## Die Lösung bei Dellwarzen

*La solution en cas de molluscum contagiosum*

*La soluzione al mollusco contagioso*

- Einfach
- Effizient
- Sicher



- Facile
- Efficace
- Sicuro

- Simple
- Efficace
- Sûr

**„Topisches Kaliumhydroxid zur Behandlung von Molluscum contagiosum erspart betroffenen Kindern die aggressiveren physikalischen Therapieformen.“<sup>3</sup>**


**Schnelle und effiziente Wirkung**  
*Une action rapide et efficace*  
**Azione rapida ed efficace**

**INFECTODELL®**

## Wirksamkeit: Durch Studien belegt

*Efficacité prouvée par des études*

Efficacità confermata da studi clinici



Abheilung in nur 4 Wochen  
**73%** } *Soignés après 4 semaines*  
Guarigione in 4 settimane

Keine Rezidive <sup>1-5</sup>  
*Pas de récidence* <sup>1-5</sup>  
Nessuna recidiva <sup>1-5</sup>

## Verträglichkeit: Hervorragend

- Hohe Compliance > 90% <sup>1,2,3,5</sup>
- Minimale Nebenwirkungen
- Unblutige Anwendung
- Keine Lokalanästhesie nötig

*Tolérance: excellente*

- *Très bonne observance > 90%* <sup>1,2,3,5</sup>
- *Effets secondaires minimales*
- *Utilisation sans saignement*
- *Sans anesthésie locale*

**Tolleranza eccellente**

- Grande Compliance > 90% <sup>1,2,3,5</sup>
- Effetti secondari minimi
- Utilizzo senza sanguinamento
- Senza anestesia locale

Lit.:

1. Jansen et al. (2007) Akt. Dermatol. 33 : 210-215
2. Short et al. (2006) Pediatr. Dermatol. 23 : 279-281
3. Romiti (2006) Unpublished data zu 4
4. Romiti et al. (2000) Pediatr. Dermatol. 17 : 495
5. Romiti et al. (1999) Pediatr. Dermatol. 16: 228-231

**Einfache und sichere Anwendung**  
*Une application simple et sûre*  
**Applicazione facile e sicura**

**INFECTODELL®**

### 1. Spatel an der Innenseite der Flasche sorgfältig abstreifen.


*Essuyer la spatule imbibée d'InfectoDell soigneusement sur le rebord du flacon.*  
Togliere sulla spatolina bagnata l'eccesso di liquido passandola contro la superficie interna del flacone



### 2. Dellwarze mit InfectoDell betupfen. Anwendung täglich morgens und abends wiederholen.

*Tamponner tous les molluscum contagiosum. Répéter l'application matin et soir.*


Tamponare ogni mollusco contagioso con InfectoDell due volte al giorno (mattino e sera).



### 3. Anwendung beenden, sobald eine Entzündung die Abheilung der Dellwarze anzeigt.

*Arrêter l'application dès qu'une inflammation annonce la guérison du molluscum contagiosum.*

Sospendere l'applicazione non appena l'infiammazione indica la guarigione del mollusco contagioso.



### 4. Nach ca. 2-6 Wochen ist die Dellwarze abgeheilt.

*Le molluscum contagiosum est guéri après 2 à 6 semaines.*

Dopo ca. 2-6 settimane il mollusco contagioso sarà guarito.



Zusammensetzung: 1 ml Lösung enthält 50 mg Kaliumhydroxid. Weitere Bestandteile: gereinigtes Wasser.  
Composition: 1 ml de solution contient 50 mg d'hydroxyde de potassium. Autres composants : eau purifiée.  
Composizione : 1 ml di soluzione contiene 50 mg di idrossido di potassio. Altre componenti: acqua purificata.