

INFECTODELL[®] gegen Dellwarzen

Liebe Patientin, lieber Patient,

Sie haben INFECTODELL erhalten, weil Sie an Dellwarzen leiden.

Dellwarzen werden durch das Molluscum contagiosum-Virus verursacht. Damit Sie diese schnell wieder loswerden, ist es wichtig, dass Sie INFECTODELL richtig anwenden. Dabei sollen Ihnen die nachfolgenden Informationen helfen.

Arztstempel

Was müssen Sie vor der ersten Anwendung tun?

- INFECTODELL kann bei falscher Anwendung ätzend wirken. Lesen Sie daher unbedingt den Beipackzettel mit wichtigen Hinweisen zur sicheren Anwendung sorgfältig durch.
- Notieren Sie das Datum der ersten Anwendung auf der Schachtel.
- INFECTODELL ist nach dem ersten Öffnen vier Wochen haltbar.
- Sorgen Sie bei jeder Anwendung für eine sehr gute Beleuchtung.

Wie wenden Sie INFECTODELL richtig an?

- Tragen Sie INFECTODELL 2 x täglich, am besten morgens und abends, **sparsam** auf die Dellwarzen auf.
- Betupfen Sie die Dellwarzen mit dem Spatel.
- Verschiessen Sie die Flasche nach der Anwendung sorgfältig. Lassen Sie die Flasche nie offen stehen.

Wann beenden sie die Anwendung von INFECTODELL?

- Sobald eine Entzündung einer Dellwarze eintritt, wird INFECTODELL nicht mehr auf diese aufgetragen.
- Beenden Sie die Anwendung spätestens nach 14 Tagen, auch wenn es zu keiner Entzündung kam. Konsultieren Sie in diesem Fall Ihren Arzt. Dieser wird über das weitere Vorgehen entscheiden.
Die Behandlung von Dellwarzen kann einige Zeit dauern. Bitte haben Sie Geduld und beachten Sie den Beipackzettel und die umseitige Schritt-für-Schritt Anleitung.

Was ist für eine sichere Anwendung von INFECTODELL wichtig?

- Vermeiden Sie den Kontakt mit:
 - Augen
 - der Region um die Augen, Nase und Mund
 - dem Genitalbereich
 - offenen Wunden oder aufgekratzter Haut
- Falls InfectoDell doch auf eine dieser Stellen gelangt, waschen Sie diese sofort mit viel Wasser ab
- Lagern Sie INFECTODELL immer:
 - ausserhalb der Reichweite von Kindern
 - aufrecht stehend
 - fest verschlossen

So wenden Sie **INFECTODELL**® richtig an – Schritt für Schritt

Schritt 1 – Datum notieren

- Notieren Sie das Datum der ersten Anwendung auf der Schachtel.

Schritt 2 – benetzen Sie den Spatel mit InfectoDell


- Öffnen Sie den kindergesicherten Verschluss und ziehen Sie den mit INFECTODELL getränkten Spatel sorgfältig heraus.
- In der Flasche befindet sich ein Schutzeinsatz mit einem kleinen Kunststoffrohr. Der Einsatz sorgt dafür, dass überschüssige Flüssigkeit abgestreift wird.



Entnehmen Sie den Spatel.

Schritt 3 – tragen Sie INFECTODELL auf die Dellwarzen auf

- Betupfen Sie alle Dellwarzen mit der flachen Seite des Spatels. Nach jeweils 1-3 Dellwarzen sollten Sie den Spatel erneut mit INFECTODELL benetzen (Schritt 2).
- Verschliessen Sie nach der Anwendung die Flasche sorgfältig. Lagern Sie INFECTODELL immer ausserhalb der Reichweite von Kindern.




Betupfen Sie die Dellwarzen mit INFECTODELL

Schritt 4 – wiederholen Sie die Anwendung täglich

- Tragen Sie INFECTODELL wie in Schritt 2 und 3 beschrieben **täglich zweimal**, am besten morgens und abends, auf die Dellwarzen auf.

Schritt 5 – beenden Sie die Anwendung


- Beenden Sie die Anwendung, sobald eine Entzündung die Abheilung einer Dellwarze anzeigt. Die Entzündung erkennen Sie an einer mindestens 12 Stunden anhaltenden Rötung.
- Beenden Sie die Anwendung spätestens nach 14 Tagen, auch wenn es zu keiner Entzündung kam. Konsultieren Sie in diesem Fall Ihren Arzt. Dieser wird über das weitere Vorgehen entscheiden.




Beenden Sie die Anwendung, sobald eine Entzündung die Abheilung einer Dellwarze anzeigt.

Schritt 6 – warten Sie die Abheilung der Dellwarzen ab

- Die Entzündung zeigt, dass Ihr Immunsystem die Molluscum contagiosum-Viren erkannt hat. Haben sie nun etwas Geduld und warten Sie die Abheilung der Dellwarzen ab. INFECTODELL darf nun nicht mehr angewendet werden.



Haben Sie Geduld. Nach 2-6 Wochen ist die Dellwarze in der Regel abgeheilt.

Gute Besserung wünscht Ihnen  **AllergyCare**